

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации соискателя кафедры общей хирургии №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Гуломова Лоика Абдурахмоновича на тему «Оптимизация диагностики и хирургической тактики лечения больных острым обтурационным холециститом высокого риска» представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по шифру 3.1.9– хирургия.

Острый холецистит является одним из распространенных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Летальность при этом составляет 1,5 – 12%, а у больных «высокого риска» достигает 15-25%. Трудности диагностики и лечения острого обтурационного холецистита у больных «высокого риска» объясняются наличием сопутствующих заболеваний многих органов- и систем в стадии суб- и декомпенсации, особенностями течения заболевания, обусловленными возрастными изменениями организма, снижением компенсаторных и резервных возможностей, большой давности обтурации до госпитализации и отсутствием единых взглядов в выборе адекватной хирургической тактики. Сложность выполнения лапароскопического вмешательства при обтурационном холецистите у больных «высокого риска», нередко приводит к переходу на лапаротомию, может сопровождаться развитием тяжелых осложнений во время операции и в раннем послеоперационном периоде. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения различных аспектов проведения дифференцированной хирургической тактики и выбора методов и способов холецистэктомии при остром обтурационном холецистите «высокого риска».

Все это и обуславливает актуальность для проведения исследования данной диссертационной работы.

В связи с этим, на материале клиники, соискатель Гуломов Л.А. провели исследование по оптимизации диагностики и хирургическая тактика лечения острого обтурационного холецистита «высокого риска»

с применением современных технологий. В ходе исследования автором доказано взаимосвязь между степенью выраженности воспалительных изменений в желчном пузыре и маркеров воспаления. Для клинической практики определены критерии включения и критерии исключения для проведения двухэтапной тактики. Доказано преимущества применения внутрисполостного лазерного излучения у этого тяжелого контингента больных. Разработан алгоритм двухэтапной тактики лечения больных острым обтурационным холециститом. Доказано преимущества двухэтапной тактики лечения больных острым обтурационным холециститом имеющий высокий риск. Чётко показаны критерии выполнения заключительного этапа после наложения микрохолецистостомы под УЗИ наведением, путём микроскопического исследования желчи.

В диссертации использованы современные, адекватные методы исследования. Выводы и практические рекомендации обоснованы, достоверны и могут применяться в повседневной клинической практике.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ и полностью отражает содержание диссертационной работы Гуломова Лоика Абдурахмоновича.

Научный сотрудник,

ГУ «Республиканский научный центр

сердечно-сосудистой хирургии»

МЗ и СЗН РТ

доктор медицинских наук,



Ш.Ш. Амонов



Таджикистан г. Душанбе, ул. Санои 33, 734003

Тел: +992918761013