

УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по науке и издательской
деятельности ГОУ «ТГМУ им. Абуали
ибни Сино», д.м.н., профессор
Дж. К. Мухаббатзода
« 07 » « 07 » 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственное образовательное учреждение «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Диссертация Султонова Рахмонали Бороновича на тему: «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп» выполнена на кафедре хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино» МЗ и СЗН РТ.

В период подготовки диссертации Султонов Рахмонали Боронович являлся соискателем кафедры хирургических болезней №1 (2019-2021 г), работает в ГУ «Городской центр скорой медицинской помощи» г. Душанбе, врачом эндохирургического отделения.

В 2011 году окончил ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» по специальности «Лечебное дело».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» в 2020 г.

Тема утверждена на заседании Учёного совета медицинского факультета, протокол №5 от 21.06.2019.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Махмадов Ф.И., профессор кафедры хирургических болезней №1 им академика Курбонова К.М. ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» МЗ и СЗН РТ.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность. Наружные грыжи живота встречаются у 3-4 % населения, а среди лиц пожилого и старческого возраста – у 15-17%, что, несомненно, приводит к снижению качества их жизни, утрате трудоспособности и инвалидизации. Среди пациентов с наружными грыжами живота паховые грыжи составляют примерно 80%. Для их лечения используют различные способы операций, количество которых на сегодняшний день достигает более 1000, что говорит о неудовлетворенности хирургов результатами лечения этого заболевания. Несмотря на совершенствование способов герниопластики, по-прежнему остается высоким процент рецидивов грыж, частота которых варьирует по данным литературы от 5 до 45%. Внедрение новых методов хирургического лечения привело к значительному снижению частоты рецидивов паховой грыжи (до 1-5%). В клиниках, специально занимающихся диагностикой и лечением паховых грыж, частота рецидивов снижена до минимума и не превышает 1-1,5% .

Личный вклад автора в проведенном исследовании. Автором самостоятельно проведено обследование, ведение пациентов, выполнение и участие в оперативных вмешательствах. Соискателем самостоятельно был проведен целенаправленный сбор, анализ клинического материала, статистическая обработка полученных результатов, обобщение, заключение, а также написание научных статей и разработка рационализаторских предложений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, полученных диссертантом. Научные положения, выводы и практические рекомендации отражают суть диссертационной работы, вытекают из фактического материала, высокоинформативных методов исследования. Для решения поставленных задач диссертантом обследовано 110 больных с паховыми грыжами лиц старших возрастных групп. Все пациентки прошли лечение в ГУ «Городском центре скорой медицинской помощи» г. Душанбе. Пациентам наряду с общеклиническими, биохимическими методами исследования, проводились морфологические

исследования, УЗИ, КТ, МРТ. Достоверность полученных автором результатов подтверждена высоким методическим уровнем исследований и статистической обработкой научного материала.

Научная новизна. Установлена частота встречаемости паховых грыж у лиц старших возрастных групп в Республике Таджикистан. Доказано, что с увеличением размеров паховых грыж, длительности грыженосительства у лиц старших возрастных групп, наблюдается атрофия наружной и внутренней косой мышцы живота. Выявлены особенности функционального состояния передней брюшной стенки у грыженосителей старших возрастных групп, в частности в отличие от здоровых людей, при напряжении мышц нарушено уменьшение ширины косых мышц живота, что, по сути, считается предрасполагающим фактором деструктивного изменения тканей апоневроза абдоминальных мышц и возрастания размеров возникшего грыжевого дефекта. Разработаны модифицированные способы герниопластики при прямых паховых грыжах у пациентов старших возрастных групп.

Практическая значимость работы. В работу клинических отделений внедрена хирургическая тактика лечения больных с паховыми грыжами СВГ, основанная на дифференцированном подходе выбора метода пластики ПК. В практику базовых отделений клиники внедрена разработанная модифицированная лапароскопическая герниопластика при прямых ПГ у лиц СВГ. В результате анализа лечения СВГ с ПГ доказана эффективность и целесообразность применения индивидуальной тактики, с учетом сопутствующих патологий и состояния тканей паховой области у лиц СВГ.

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой рекомендуется к защите. Диссертация, представленная Султоновым Р.Б. посвящена оптимизации хирургического лечения паховых грыж у лиц старших возрастных групп, применением малоинвазивной технологии, что соответствует специальности 14.01.17 - Хирургия.

Работа соответствует следующим пунктам паспорта научной специальности: 3.1. Этиология. Патогенез. Диагностика, лечение и профилактика врожденных заболеваний органов брюшной полости (желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, поджелудочной

железы) и грудной клетки (легких, пищевода, плевры, средостения, диафрагмы). 3.8. Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода.

Полнота изложения материала в публикациях. Полученные автором результаты исследований полностью отражены в опубликованных работах. По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 4 в журналах рекомендуемых ВАК РФ и ВАК при Президенте РТ, в том числе 1 монография, получен 1 патент РТ на изобретение и 1 удостоверение на рационализаторское предложение.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Makhmadov F. The results of laparoscopic hernioplasty in patients of older age groups /F. Makhmadov, R. Sulonov// 44th Korean Society of Endoscopy & Laparoscopic Surgery and 9th International Symposium. – Seoul. – 2019. – PP03-12.
- 2 Makhmadov F. Efficiency of laparoscopic hernioplastics in patients of senior age groups /F. Makhmadov, R. Sulonov// Abstracts of the XVIII International Euroasian Congress of Surgery and Hepatogastroenterology. – Baku. – 2019. – P. 107-108.
- 3. Махмадов Ф.И. Результаты лапароскопической герниопластики у больных старших возрастных групп / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Журнал «Здравоохранение Таджикиста на». – 2020. - №1 (344). – С.33-38.**
4. Makhmadov F. Diagnosis and laparoscopic hernioplasty for strangulated inguinal hernias in the elderly /F. Makhmadov, R. Sulonov// 46th Korean Society of Endoscopy & Laparoscopic Surgery and 10th International Symposium in Conjunction with the Korean Association of Robotic Surgeons Congress. – Seoul. – 2020. – P. 232.
5. Makhmadov F. The choice of method of laparoscopic hernioplasty in elderly patients /F. Makhmadov, R. Sulonov// Asian Congress of Robotic and

Laparoscopic Surgery. – Seoul. – 2020. – Poster No.: ACRLS2020Abs-028 [General Surgery].

6. Makhmadov F. Ways to Improve the Results of Surgical Treatment of Inguinal Hernias in Elderly and Infantile Patients, Using Videolaparoscopy /F. Makhmadov, R. Sulonov// The Korean Society of Endoscopy & Laparoscopic Surgery 25th Anniversary & 48th Annual Congress & 11th International Simposium. - Seoul. - 2021. - P.253 [ABS-0076 EP01-03].

7. Махмадов Ф.И. Пути улучшения результатов хирургического лечения паховых грыж у пациентов пожилого и старческого возраста, применением видеолапароскопии / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Журнал «Московский хирургический журнал». – Москва. – 2021. - №2. – С.79-81.

8. Махмадов Ф.И. Лапароскопическая герниопластика у лиц старших возрастных групп (Особенности выбора с учетом морфологических изменений тканей, образующих паховый канал) / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Журнал «Вестник Авиценны». – 2021. – Т.21, №3. – С. (статья находится на стадии печати).

9. Махмадов Ф.И. Выбор метода лечения паховых грыж у пациентов старших возрастных групп / Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов // Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. - Москва. - 2021. - Т.23, №5. - С.29.

Патент на изобретение.

- 1 Способ лапароскопической герниопластики у больных старших возрастных групп с прямыми паховыми грыжами /Махмадов Ф.И., Султонов Р.Б. // патента TJ #1236 от 14.05.21 г.

Рационализаторское предложение:

1. Способ лапароскопической герниопластики у пациентов старших возрастных групп с прямыми паховыми грыжами /Махмадов Ф.И., Султонов Р.Б.// Рационализаторское предложение №3419/R410 от 05/01/2021г.

Диссертация Султонова Рахмонали Бороновича на тему: «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп»

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - Хирургия.

Заключение принято на заседании межкафедральной комиссии по хирургическим дисциплинам ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино».

Присутствовали на заседании 21 человек. Результаты голосования: «за» - 21 человека, «против» и «воздержавшихся» - нет, протокол №10 от 30.06.2023 г.

**Председатель межкафедральной
комиссии по хирургическим
дисциплинам ГОУ «ТГМУ имени
Абуали ибни Сино», д.м.н.,**



Курбонов Х.Х.

**Секретарь межкафедральной
комиссии по хирургическим
дисциплинам ГОУ «ТГМУ имени
Абуали ибни Сино», к.м.н, доцент**



Салимов Дж.С.

Рецензенты:

**Заведующей кафедры топографической
анатомии и оперативной хирургии
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино»,**



д.м.н. Курбонов Дж.М.

Директор ЛДЦ «Вароруд»



д.м.н. Рахматуллоев Р.

