

Отзыв научного руководителя

на диссертационную работу соискателя кафедры анатомии человека и латинской медицинской терминологии им. Я. А. Рахимова ТГМУ им. Абуали ибни Сино Алиева Азима Анваровича «Морфологическая характеристика желёз и лимфоидных образований внепечёночных желчевыводящих путей в постнатальном онтогенезе человека», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, по специальности 14.03.01 - анатомия человека.

Несмотря на функциональную значимость желчевыводящих путей, распространенность различной патологии их органов, их морфологические особенности в условиях нормы изучены крайне недостаточно. Остаются неизученными количественно – размерные показатели желез и лимфоидных образований в стенках этих органов: нет информации об общем количестве желез, лимфоидных узелков, их форме, микротопографии. Не изучены половые особенности желёз и лимфоидных образований внепечёночных желчевыводящих путей, их индивидуальные анатомические особенности. Нет данных по вопросу об особенностях конструкции желёз и лимфоидных образований в разных участках стенки внепечёночных желчевыводящих путей, включая зону сфинктера Люткенса, регулирующего пассаж желчи по желчевыводящим путям.

Поэтому соискатель Алиев А. А., правильно поставил себе цель и задачу исследования, для получения соответствующей научной информации.

Объектом исследования явились железы и лимфоидные образования внепечёночных желчевыводящих путей (пузырного, общего печечного и общего желчного протоков), полученные от трупов 361 людей мужского и женского полов разного возраста.

Впервые на значительном количественно адекватно подобранном материале получены комплексные данные анатомии и топографии желез и лимфоидных образований внепечечных желчевыводящих путей, изучено их количество, плотность и область расположения в стенках этих органов с учетом возраста и пола.

Выявлено наличие убывания проксимо – дистального градиента в стенках пузырного, общего печечного и общего желчного протоков. Показано уменьшение с которым количества, плотности расположения размерных характеристик (длина, ширина, толщина, площадь) желез и лимфоидных узелков в направлении к двенадцатиперстной кишке.

Установлено, что в области сфинктера Люткенса железы и лимфоидные образования формируют скопления. Железы этой области отличаются от

соседних, расположенных во внесфинктерных участках стенки пузырьного протока большей длиной и шириной начальных отделов.

Получены новые данные о возрастных особенностях желез и лимфоидных образований в стенках внепеченочных желчевыводящих путей. Продemonстрировано максимальное развитие лимфоидного аппарата в период раннего детства (наиболее крупные лимфоидные узелки, максимальное абсолютное количество клеток лимфоидного ряда в составе диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных узелков, процентное содержание малых лимфоцитов, активные процессы лимфоцитопоеза и др.). Наиболее выраженная возрастная инволюция лимфоидных структур отмечается в пожилом, старческом возрастах и у долгожителей.

Научный руководитель:

Д.М.Н.



Девонаев О.Т.

