

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии, трансплантологии и урологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самаркандский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Курбаниязова Зафаржона Бабажановича на диссертацию Султонова Рахмонали Бороновича на тему: «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия.

Актуальность темы диссертации. Актуальность темы диссертации Султонова Р.Б. «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп» не вызывает сомнения. Наружные грыжи живота встречаются у 3-4% населения, а среди лиц пожилого и старческого возраста – у 15-17%, что, несомненно, приводит к снижению качества их жизни, утрате трудоспособности и инвалидизации (Белоконев В.И. и соавт., 2020; Muysoms F.E. et al., 2015). Среди пациентов с наружными грыжами живота паховые грыжи составляют примерно 80%. Для их лечения используют различные способы операций, количество которых на сегодняшний день достигает более 1000, что говорит о неудовлетворенности хирургов результатами лечения этого заболевания (Колесников С.А., 2019; Georgiev-Hristov T. et al., 2018).

Несмотря на совершенствование способов герниопластики, по-прежнему остается высоким процент рецидивов грыж, частота которых варьирует по данным литературы от 5 до 45%. Внедрение новых методов хирургического лечения привело к значительному снижению частоты рецидивов паховой грыжи (до 1-5%) (Гостищев В.К. и соавт., 2018; Mayer F. et al., 2019). В клиниках, специально занимающихся диагностикой и лечением паховых грыж, частота рецидивов снижена до минимума и не превышает 1-1,5%.

Таким образом, исследования относительно аспектам предоперационного обследования, подготовки и послеоперационного ведения, а также критерии оценки и принцип отбора пациентов старших возрастных групп, имеют весомое научное и практическое значение, а диссертационная работа Султонова Р.Б., в которой проведено изучение морфологических изменений тканей, образующих паховый канал у лиц старших возрастных групп и оценка значимости лапароскопических ненапряжных способов герниопластики, безусловно, является актуальной.

Научная новизна исследования, результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертационной работе Р.Б. Султоновым проведено важное исследование по изучению морфологических изменений тканей, образующих паховый канал у лиц старших возрастных групп, которое проведено с использованием современных методов обследования. Установлена частота встречаемости паховых грыж у лиц старших возрастных групп в Республике Таджикистан. Доказано, что с увеличением размеров паховых грыж, длительности грыженосительства у лиц старших возрастных групп, наблюдается атрофия наружной и внутренней косой мышцы живота. Выявлены особенности функционального состояния передней брюшной стенки у грыженосителей старших возрастных групп. Установлена, что у пациентов СВГ с ПГ, в отличие от здоровых людей, при напряжении мышц нарушено уменьшение ширины косых мышц живота, что, по сути, считается predisposing фактором деструктивного изменения тканей апоневроза абдоминальных мышц и возрастания размеров возникшего грыжевого дефекта. Разработаны модифицированные способы герниопластики при прямых паховых грыжах у пациентов старших возрастных групп, на которое имеется патент РТ на изобретение.

Исследования выполнены на высоком научно-методическом уровне. Полученные автором результаты тщательно обработаны с применением статистических методов, обоснованы, что позволяет объективно оценивать их значимость.

Значимость для науки и практической деятельности полученных соискателем результатов.

Выполненная Султоновым Р.Б. работа имеет высокую теоретическую и практическую значимость. Соискателем впервые выявленная частота грыженосительства у пациентов старших возрастных групп, позволили акцентировать внимание на актуальности данной проблемы. Особенности функционального состояния соединительной ткани паховой области у грыженосителей старших возрастных групп, определили его как важное звено патогенеза грыжеобразования ее рецидивирования, а также выбора верной хирургической тактики. Изученные проявления морфологических изменений соединительной ткани паховой области у лиц старших возрастных групп, убедительно подтверждают важность предоперационной оценки ее тяжести и выбора способа герниопластики.

Внедрение в клиническую практику хирургическая тактика лечения больных с паховыми грыжами СВГ, основанная на дифференцированном подходе выбора метода пластики ПК, позволило улучшить результаты хирургического лечения данного контингента больных. В практику базовых отделений клиники внедрена разработанная модифицированная лапароскопическая герниопластика при прямых ПГ у лиц СВГ. В результате анализа лечения СВГ с ПГ доказана эффективность и целесообразность

применения индивидуальной тактики, с учетом сопутствующих патологий и состояния тканей паховой области у лиц СВГ.

Предложенный диагностический и лечебный алгоритм при лечении пациентов старших возрастных групп с паховыми грыжами рекомендуется реализовывать в лечебно-профилактических учреждениях.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы

Выводы и результаты диссертационной работы соискателя могут быть использованы в клинической практике при лечении категории пациентов старших возрастных групп, с паховыми грыжами в медицинских организациях на местном и региональном уровнях.

Результаты диссертационной работы внедрены в клиническую практику хирургических отделений ГУ «Городской центр скорой медицинской помощи» и ГУ «Медицинский Комплекс Истиклол» г. Душанбе.

Материалы диссертации используются на лекциях и практических занятиях кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали Ибни Сино».

Перспективным является дальнейшее использование разработанного автором модифицированного способа герниопластики у больных старших возрастных групп с паховыми грыжами, закрепленного патентом РТ. Представленные практические рекомендации целесообразно внедрить в клиническую практику специализированных стационаров, занимающихся герниологией, что позволит улучшить результаты лечения данной патологии.

Содержание работы, ее завершенность и оформление

Для построения диссертации Султонов Р.Б. избрал классическую схему, которая состоит из введения, обзора литературы, характеристики материалов и методов исследования, глав собственных исследований с результатами и их обсуждением, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 102 отечественных и 106 иностранных авторов. Материалы диссертации иллюстрированы 19 таблицами и 48 рисунками. Диссертация написана хорошим литературным языком, изложена на 146 странице.

Введение диссертации содержит обоснование актуальности темы исследования. Диссертант четко формулирует цели и задачи работы, определяет ее научную новизну и практическую значимость, предлагает положения, выносимые на защиту.

Глава I - представляет собой литературный обзор по теме диссертации, где проведен подробный анализ отечественных и зарубежных источников, что позволило диссертанту собрать и обобщить известный материал по изучаемому вопросу. Показано, что проблема хирургического лечения паховых грыж у лиц старших возрастных лиц, является актуальной

темой в современной хирургии. Увеличение числа больных с данной патологией и рецидивов грыж, позволило автору аргументировано мотивировать необходимость исследования вопроса не только разработки тактики хирургического лечения, но и их послеоперационной реабилитации. Этот раздел исследования показывает, что автором достаточно и в полном объеме рассмотрена изучаемая проблема.

Глава II – Материалы и методы исследования – с методологической точки зрения и объема проведенных исследований диссертационная работа не вызывает возражений. В основу исследования включено изучение результатов хирургического лечения 110 пациентов с паховыми грыжами старших возрастных групп. В зависимости от применяемых методов хирургического лечения, все пациенты были разделены на 2 группы. В основную группу вошли 60 (54,5%) больных, у которых применялись лапароскопические способы герниопластики, в контрольную группу вошли 50 (45,5%) больных, у которых применялись традиционные способы грыжесечений. Дана полная характеристика специальным макроскопическим и морфологическим методом исследования. Клиническое исследование проведено тщательно, на современном уровне, полученные данные обработаны с использованием методов доказательной медицины. Количество и объем проведенных исследований позволяют формулировать концептуальные положения диссертации. Все это в сумме позволяет считать результаты диссертации достоверными и обоснованными.

Глава III – посвящена результатам исследования пациентов с паховой грыжей старших возрастных групп. В этой главе проведена характеристика эпидемиологической ситуации встречаемости паховых грыж у лиц старших возрастных групп, исследования морфофункциональной особенности брюшного пресса и макроскопических изменений тканей пахового промежутка у пациентов старших возрастных групп. Импонирует, что автором разработан способ интраоперационной диагностики анатомо-функциональной недостаточности при паховых грыжах у лиц старших возрастных групп.

Глава IV – посвящена хирургической тактике паховых грыж у лиц старших возрастных групп. Подробно изложены особенности предоперационной подготовки пациентов старших возрастных групп с использованием усовершенствованной классификации ASA, в которой учитываются как общие, так и местные факторы операционно-анестезиологического риска. Также в главе автором разработаны критерии выбора способа лапароскопической герниопластики, что позволило придерживаться индивидуализированной тактики лечения для каждого пациента, с учетом результатов физикального и инструментального методов исследований.

Разработанный модифицированный способ лапароскопической герниопластики позволило автору значительно уменьшить количество послеоперационных осложнений, по сравнению контрольной группы.

В главе диссертации анализируются непосредственные результаты хирургического лечения различных методик операций. Интересными являются сведения автора о том, что после лапароскопических вмешательств показатели послеоперационных осложнений составило 5,0%, тогда как после традиционных - оно достигала 12,0%. Приведенные автором результаты убедительны и могут быть предложены в системе практического здравоохранения.

В разделе «Обсуждение полученных результатов» подведены итоги проведенным исследованиям, проведен квалифицированный анализ концептуальных положений диссертации. Диссертант, основываясь на полученных данных, доказательно подводит фундамент под выводы и практические рекомендации. Диссертант аргументирует целесообразность использования разработанного им лечебно-диагностического алгоритма для выработки тактики хирургического лечения и послеоперационной реабилитации больных старших возрастных групп с паховыми грыжами.

Выводы диссертационного исследования обоснованы и вытекают из итогов проведенных исследований. Автору грамотно удалось представить основные итоги проделанной работы. Практические рекомендации подтверждают высокую практическую ценность настоящей научной работы, содержат необходимые сведения для внедрения выводов диссертации в практику.

Содержание автореферата и 11 научных работ (из них 4 публикаций в рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан изданиях для публикации результатов диссертационных исследований, получено 1 патент РТ на изобретение и 1 удостоверение на рационализаторское предложение), что полностью отражают основное содержание диссертации.

Вопросы и замечания.

В диссертационной работе имеются некоторые стилистические, терминологические неточности, что не влияют на общую оценку диссертации. Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. Работа заслуживает положительной оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Диссертация Султонова Рахмонали Бороновича «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц старших возрастных групп», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17- Хирургия, выполненная под руководством доктора медицинских наук, доцента Махмадова Фаруха Исроиловича, научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных исследований и сформулированных автором научных положений, содержится решение актуальной задачи - улучшения результатов хирургического лечения больных старших возрастных групп с паховыми грыжами путём применения видеолапароскопии.

По своей актуальности, научной новизне, степени обоснованности научных положений, теоретической и практической значимости, по

отражению основных положений в печати, диссертация Р.Б. Султонова полностью соответствует требованиям «Типового Положения о диссертационных советах» и «Положении о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

Официальный оппонент:


Заведующий кафедрой хирургии, трансплантологии и урологии Самаркандского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан доктор медицинских наук, профессор



Курбаниязов Зафар Бабажанович

«01» 12 2023 г.

Ученый секретарь Самаркандского государственного медицинского университета, Минздрава Узбекистан, к.м.н., доцент



Очилов Улугбек Усманович

Контактная информация:

191015, Республика Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура д. 18
Тел.: (998) 66 233 08 41; факс (998) 66 233 71 15
Интернет-сайт: sammu.uz
E-mail: sammu@sammu.uz

