

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы докторанта (PhD) кафедры хирургических болезней №2 им. акад. Усманова Н.У. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» Хамидова Фаридуна Маъруфовича «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у мужчин», представленной в диссертационный совет 6Д.КОА-040 при ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110117 – Хирургия.

Проблема хирургического лечения грыж передней брюшной стенки до сих пор остаётся одной из сложных и не до конца решенных задач современной абдоминальной хирургии. По данным авторов ежегодно в мире выполняется около 20 миллионов грыжесечений, что свидетельствует о том, эта нозология остаётся одним из распространенных абдоминальных хирургических патологий, находясь на третьем месте уступая по числу аппендиктомии и холецистэктомии.

Среди всех грыж передней брюшной стенки наиболее часто встречаются паховые грыжи, частота которых по данным ряда авторов варьирует от 50,7 до 80% случаев. Несмотря на применение самых современных методов диагностики и имеющиеся множество методов хирургического лечения паховых грыж, многие аспекты данной патологии остаются нерешёнными, а результаты их лечения на сегодняшний день остаются малоутешительными, вследствие высокой частоты рецидива.

По данным литературных источников более половины заболеваний органов репродуктивной системы у детей, ранее перенесенных традиционные паховое грыжесечение могут быть в будущем причиной бесплодности, к которым также относятся и паховая грыжа. При этом невыполненная оперативное вмешательство приводят к увеличению температуры данной области приводя к тепловым и механическим изменениям трофики яичка, именуемым в литературе термином «тепловой кастрации».

В последние годы в литературе встречаются множество научных работ, направленных на изучение причин различных осложнений при паховых грыжах и способов их пластики. Ведётся поиск альтернативных путей при

оперативном лечении паховых грыж у детей с целью профилактики ятрогенного повреждения элементов семенного канатика. В отечественной и зарубежной литературе многочисленными авторами утверждается, что при традиционных методах оперативного лечения сохраняется риск повреждения семенного канатика и яичковой артерии и связанной с ней атрофии яичка, вен гроздевидного сплетения с развитием орхита и более грозных осложнений при выделении грыжевого мешка и этапах пластики.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Хамирова Фаридуна Маъруфовича на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у мужчин», является научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научные достижения в развитии науки. По своей научной новизне, практической значимости, по объёму выполненных исследований и методическому подходу диссертационная работа полностью соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267(с изменениями и дополнениями от 26.06.23 №295), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора философии (PhD), а её автор Хамидов Фаридун Маъруфович заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110117 –Хирургия.

Заведующий кафедры  
хирургических болезней №2 ТНУ,  
к.м.н.

Юлдошов М.А.

«25 » июль 2023г.


Контактная информация: Таджикский национальный университет

Почтовый адрес: Республика Таджикистан, 734035, г. Душанбе, пр.

Тел: + (992 - 37) 221 – 77 -11, 221-74-22

E-mail.ru:[tnu.int.re@gmail.com](mailto:tnu.int.re@gmail.com)

Сайт:<http://www.tnu.tj>



25.11.2023